

MATÉRIAUX

Matériel nécessaire :

- Civière scoop
- Au moins trois sangles pour sécuriser le patient
- Dispositif Head Blocks

PRÉPARATION

- Informer le patient de l'indication, de la procédure et de la coopération éventuelle du patient.
- Si nécessaire, cette procédure est précédée par :
 - **P34** Retourner le patient avec la technique du rouleau en bloc (2 soignants).
 - P06 Mise en place de la MILS

MISE EN OEUVRE

| | |
|----------------------------------|---|
| Préparatifs | Fait effectuer au collègue un contact physique avant contact verbal (MILS). |
| | Procède à un réalignement des épaules de la victime (abaissé légèrement, position anatomique neutre). |
| Positionnement des Head blocks | Place de manière centrée le coussin occipital (embase) du dispositif sous la tête de la victime, si nécessaire avec l'aide du collègue. |
| | Positionne les deux Head blocks de manière symétrique sur les velcros de l'embase du dispositif. |
| | Adapte la position des Head blocks par rapport à la morphologie de la victime (ouvertures pour les oreilles vs contact avec la base du cou). |
| | Positionne la sangle frontale de manière symétrique et avec une force égale, en rapprochant les Head blocks de la tête de la victime mais sans exercer de pression excessive. |
| | Positionne la sangle mentonnière de manière symétrique et avec une force égale, en rapprochant les Head blocks de la tête de la victime mais sans exercer de pression excessive. |
| | A ce stade, permet le relâchement de la MILS exercée jusqu'alors par le collègue. |
| Préparatifs pour la SCOOP (tête) | Positionne la SCOOP à côté de la victime dans le bon sens. |
| | Positionne le haut de la scoop de manière à anticiper son positionnement ultérieur Laisser un espace suffisant - 2 travers de doigts - entre le haut du crâne de la victime et la partie intérieure de la SCOOP. |

| | |
|------------------------------------|---|
| Préparatifs pour la SCOOP (pieds) | Déverrouille les loquets de mise à longueur de la SCOOP. |
| | Allonge la civière jusqu'au pieds de la victime ou à défaut (victime trop grande), ne dépasse par le repère des 3 trous visibles. |
| | Verrouille les loquets de mise à longueur de la SCOOP. |
| | Continue l'allonge du SCOOP jusqu'au "CLICK" de verrouillage. |
| Positionnement des hémi scoops | Déverrouille en toute sécurité (pied entre victime et scoop) le loquet situé au sommet de la SCOOP. |
| | Donne le feu vert au collègue pour le déverrouillage du loquet situé aux pieds. |
| | Saisit (fait saisir au collègue) un hémi scoop et vient se positionner (fait se positionner le collègue) en toute sécurité de part et d'autre de la victime. |
| | A tour de rôle, effectue (fait effectuer au collègue) une légère rotation en bloc de la victime en la saisissant au niveau de l'épaule et du bassin et en prenant soin d'englober le membre supérieur durant la manœuvre. |
| | A tout de rôle, glisse (fait glisser au collègue) un hémi scoop sous la victime en prenant soin de respecter la mesure de sécurité à la tête (2 travers de doigts). |
| Fermeture du scoop | Se positionne à la tête afin d'effectuer le verrouillage du loquet situé au sommet du SCOOP, en prenant garde de ne pas engendrer de choc au niveau de la victime et en demandant l'assistance du collègue pour éviter que la manœuvre n'engendre un écartement des deux hémi scoops aux pieds de la victime. |
| | S'assure que le loquet est bien verrouillé. |
| | Donne le feu vert au collègue pour le verrouillage du loquet situé aux pieds, au besoin, porte assistance au collègue durant la manœuvre. |
| Immobilisation en 3 points | Positionne avec l'aide du collègue une première sangle, au plus de près de la victime, au niveau du thorax, sous les aisselles. |
| | Veille à ce que l'ajustement au plus près de la victime de la sangle thoracique s'opère lorsque la victime est en fin de phase inspiratoire. |
| | Positionne avec l'aide du collègue une deuxième sangle, au plus de près de la victime, au niveau du bassin, idéalement au niveau de l'axe des grands trochanters. |
| | Positionne avec l'aide du collègue une troisième sangle, au plus de près de la victime, au-dessus des genoux ou à défaut au niveau des pieds, au-dessus des malléoles. |
| Solidarisation HEAD BLOCKS - SCOOP | Solidarise la scoop avec le dispositif Head blocks en utilisant les velcros à disposition sur l'embase, |

| | |
|---|---|
| Renforcement du maintien des cervicales | Positionne la sangle en H en prenant soin de disposer les velcro vers le haut. |
| | Positionne et ajuste au plus près, sans serrer, les velcros situées de part et d'autre du cou de la victime sur leur vis à vis. |
| | Positionne et ajuste au plus près, sans serrer, les velcros situées de part et d'autre du sommet du crâne de la victime sur leur vis-à-vis. |
| | Positionne les velcros de manière à se prémunir d'un éventuel relâchement du maintien des cervicales durant le transport. |
| Qualité de la prise en charge | Dirige le travail de son collègue durant toute la manœuvre afin de garantir le maintien d'une MLS pendant toutes les opérations, et ce, au minimum jusqu'à ce que les sangles frontale et mentonnière aient été positionnées. |
| | Opère une bonne communication avec le collègue, notamment durant le sanglage de la victime. |
| | Opère une prise en charge assurant le respect de l'axe tête-cou-tronc de la victime durant toutes les manœuvres. |
| | N'engendre pas de gestes/manipulations préjudiciables pour la victime. |

SUIVI/ENREGISTREMENT

- Nettoyer la civière après utilisation et, si nécessaire, nettoyer les sangles et tout autre équipement supplémentaire que vous avez utilisé.
- Informer le patient du résultat.
- Vérifier la posture du patient.
- Vérifier les signes vitaux du patient. Assurez-vous que la ceinture thoracique n'entrave pas la respiration normale.

POINTS D'ATTENTION

Soyez attentif à l'aspect psychosocial de l'événement. Communiquer suffisamment entre vous, mais pensez aussi à parler au patient. En expliquant ce qui va se passer et pourquoi c'est nécessaire, le patient aura confiance en vous en tant que soignants et en tant d'équipe.

L'utilisation de sangles en une pièce est préconisée.

Demandez l'aide d'autres services, si nécessaire, pour l'évaluation.